

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Publication périodique

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION GRANDES CULTURES

ABONNEMENT ANNUEL: 80 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

21 Mars 1984

N° de série continue 34

Bulletin n° 5

COLZA**CHARANCON DE LA TIGE**

SAVOIE, HTE SAVOIE : TRAITEZ DES QUE POSSIBLE

Le radoucissement qui se prolonge depuis une semaine a provoqué un début de vol de charançon de la tige dans les secteurs de Douvaine et Viry (Hte Savoie) à partir du 17 Mars. Un traitement est donc conseillé dès que possible.

Dans les autres départements de Rhône-Alpes, le vol important s'est confirmé en fin de semaine dernière en tous secteurs. Si il n'a pas encore été réalisé selon les préconisations de notre dernier Bulletin du 16 Mars, le traitement est à réaliser sans retard.

Cette année, le vol est important et groupé : les dégâts risquent donc d'être importants en absence de traitement car le colza est actuellement à un stade très sensible.

Produits conseillés et autorisés

Cyperméthrine (CYMBUSH et KAFIL SUPER à 0,25 l PC/ha)
 Phosalone (1200 g ma/ha)
 Parathion (300 g ma/ha)
 Méthidathion (300 g ma/ha)
 Lindane (300 g ma/ha)
 Endosulfan (400 g ma/ha)

Le DECIS, autorisé à la vente pour le traitement du charançon des siliques, donne également de bons résultats sur le charançon de la tige. Cependant, ce produit n'étant pas homologué pour cet usage, l'utilisateur en prend alors seul la responsabilité sans engagement de la firme commerciale et des services officiels.

Les pyréthréinoïdes (CYMBUSH, KAFIL SUPER, DECIS) ont l'avantage d'agir à basse température et d'avoir une longue rémanence (3 semaines).

Intervenir de préférence par un après-midi de beau temps
afin que les charançons soient en pleine activité.

Nous vous rappelons qu'à partir de la reprise de végétation, le piège doit être relevé de manière à ce que la cuvette soit tout au long du printemps au niveau du sommet de la végétation.

779